

Behandling med BIMZELX®

I samband med

- *Ankyloserande spondylit (AS)*
- *Icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA)*
- *Psoriasisartrit*

Vanliga frågor och svar



Vad händer om jag missar en dos?

Om du har glömt att använda BIMZELX kontakta läkare. Det är mycket viktigt att ta din medicin exakt enligt läkarens ordination. Hoppa inte över en dos eller ändra din injektionsrutin, även om dina symtom förbättras och du mår bättre. Tala med din läkare innan du slutar ta BIMZELX. Om du slutar med behandlingen kan dina symtom komma tillbaka.



Vilka är några av de möjliga biverkningarna av BIMZELX?

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, även om inte alla får dem. De vanligaste biverkningarna är infektioner i de övre luftvägarna med symtom som halsont eller täppt nästa, samt vita eller gula fläckar i munnen orsakade av svamp i munhålan. Läs broschyren med patientinformation för ytterligare information om möjliga biverkningar av detta läkemedel. Om du upplever tecken på allvarlig infektion, såsom feber, andfåddhet eller hudutslag med blåsor ska du omgående informera din läkare eller söka medicinsk hjälp. Håll utkik efter tecken på allergisk reaktion, såsom andningssvårigheter eller svårigheter att svälja, yrsel eller svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen, eller svår klåda på huden, med röda utslag eller upphöjda knölar, då även detta kräver omedelbar läkarvård. Sluta använda detta läkemedel och tala med din läkare om du får symtom på inflammatorisk tarmsjukdom, såsom blod i avföringen, kramp eller smärta i buken, diarré eller vikttnedgång.



Hur gör jag om jag måste resa med BIMZELX?

Förvara de förfyllda injektionspennorna/sprutorna i originalkartongen. Ljuskänsligt. Förvaras i kylskåp (2-8 °C). Bimzelx kan förvaras utanför kylskåp i upp till 25 dagar (vid högst 25 °C).



Kan jag ta BIMZELX när jag är gravid eller om jag planerar att bli gravid?

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, be din läkare om råd innan du använder detta läkemedel. Som en säkerhetsåtgärd bör man undvika användning av BIMZELX vid graviditet. Detta beror på att man inte vet hur läkemedlet påverkar barnet. Om du är en kvinna som kan bli gravid ska du använda preventivmedel när du använder detta läkemedel och i minst 17 veckor efter din sista dos av detta läkemedel.

Kan jag amma när jag tar BIMZELX?

Om du ammar eller planerar att amma, tala med din läkare innan du använder detta läkemedel. Du bör i samråd med din läkare bestämma om du kan amma eller använda BIMZELX.

REUMATOLOGI

Välkommen till din behandling med BIMZELX

Din läkare har ordinerat BIMZELX och det är nu dags för nästa steg i behandlingen. Här kommer en kort förklaring om vad som händer nu. Se även broschyren med patientinformation som levereras tillsammans med din medicin.

BIMZELX är ett biologiskt läkemedel som tillhör en läkemedelsgrupp som heter interleukin (IL)-hämmare. Till skillnad från krämer eller andra ytbehandlingar kan biologiska läkemedel angripa vissa inflammationsframkallande molekyler för att minska immunförsvarets överaktivitet och behandla tillståndet inifrån och ut. BIMZELX verkar genom att minska aktiviteten hos två proteiner som kallas IL-17A och IL-17F, som är inblandade i att orsaka inflammation. Genom att inrikta sig på dessa proteiner hjälper BIMZELX till att minska inflammationen och minska symtomen.

BIMZELX är godkänt för behandling av: **1. Måttlig till svår plackpsoriasis** hos vuxna som behöver systemisk behandling. **2. Aktiv ankyloserande spondylit (AS)** hos vuxna med tidigare otillräcklig respons på eller intolerans mot konventionell behandling. **3. Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA)** med objektiva tecken på inflammation påvisat genom förhöjt C-reaktivt protein och/eller magnetkameraundersökning hos vuxna med tidigare otillräcklig respons på eller intolerans mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). **4. Aktiv psoriasisartrit** hos vuxna med tidigare otillräckligt svar eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) där bimekizumab kan ges i mono-terapi eller i kombination med metotrexat. **5. Aktiv måttlig till svår hidradenitis suppurativa (acne inversa)** hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell systemisk HS-behandling.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR



Vad behöver jag meddela min läkare INNAN jag påbörjar behandlingen?

Tala om för din läkare om du nyligen har fått eller planerar att få ett vaccin. Du bör inte få vissa typer av vacciner (levande vacciner) när du använder BIMZELX. Se till att din vårdgivare är informerad om du har en pågående infektion eller en återkommande infektion, om du någonsin har haft tuberkulos (TB) eller om du någonsin har haft inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit).



Hur lång tid tar det för BIMZELX att verka?

Läkemedel fungerar olika för alla. Om BIMZELX fungerar för dig kan du förvänta dig att märka av fördelarna, såsom en minskning av symtom, inom 16 veckor.



Kan jag ta BIMZELX med andra läkemedel?

Innan du påbörjar behandlingen bör du se till att din läkare är medveten om dina nuvarande läkemedel och kontakta din vårdgivare om du upplever några förändringar under behandlingen.

I denna patientinformation beskrivs dosering och administrering i samband med:

1. Ankyloserande spondylit (AS)
2. Icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA)
3. Psoriasisartrit

BIMZELX administreras genom en förfylld penna eller en förfylld spruta.

Vid behandling av AS, nr-axSpA och psoriasisartrit är den rekommenderade dosen:

- 160 mg (som ges som en subkutan injektion) var fjärde vecka. Du kan välja att ta injektionen med en spruta eller en penna.

*För personer som har diagnostiserats med både psoriasisartrit och måttlig till svår plackpsoriasis är den rekommenderade dosen:

- 320 mg ges som en subkutan (320 mg) eller två subkutana (160 mg) injektioner vid vecka 0, 4, 8, 12, 16 och var åttonde vecka därefter.



Injektionsklar penna

eller

Förfylld spruta

160 mg
VECKA 12
Fjärde dosen

4 veckor

160 mg
VECKA 16*
Femte dosen

4 veckor

160 mg
VECKA 20
Sjätte dosen

4 veckor

160 mg
VECKA 24
Sjunde dosen

4 veckor

160 mg
VECKA 28
Åttonde dosen

4 veckor

NÄR DU STÅR PÅ BEHANDLINGEN KOMMER DU ATT INJICERA EN DOS LÄKEMEDEL VAR FJÄRDE VECKA. DET FINNS FÖRFYLLEDA SPRUTOR OCH INJEKTIONSKLARA PENNOR ATT VÄLJA MELLAN.

UCBCares

När en ny behandling startas kan det komma upp frågor. När det gäller läkemedel som tillhandahålls från UCB Pharma, så som BIMZELX, är du välkommen att höra av dig till oss via UCBCares.

Patientstöd finns att tillgå så snart du ordinerats BIMZELX. UCBCares® är en tjänst som finns för att hjälpa dig och svara på frågor som du kan tänkas ha gällande din behandling eller till exempel administrering av BIMZELX.

Våra samtal är inte avsedda att ersätta samtal med din läkare, men vi kan kanske hjälpa dig med frågor som uppkommer mellan läkarbesöken.

Bimzelx®
(bimekizumab)

Läs gärna mer på www.fass.se

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta möjliggör snabb identifiering av ny säkerhetsinformation. Vårdgivare uppmanas att rapportera misstänkta biverkningar.

SE-BK-2400131



Så kontaktar du oss:

TELEFON: 0200 898 671

E-POST: UCBCares.se@ucb.com

WEBB: www.ucbcares.se

