

PATIENTINFORMATION

Behandling med BIMZELX®

I samband med

- *Ankyloserande spondylit (AS)*
- *Icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA)*
- *Psoriasisartrit*

Vanliga frågor och svar



Vad händer om jag missar en dos?

Om du har glömt att använda BIMZELX kontakta läkare. Det är mycket viktigt att ta din medicin exakt enligt läkarens ordination. Hoppa inte över en dos eller ändra din injektionsrutin, även om dina symtom förbättras och du mår bättre. Tala med din läkare innan du slutar ta BIMZELX. Om du slutar med behandlingen kan dina symtom komma tillbaka.



Vilka är några av de möjliga biverkningarna av BIMZELX?

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, även om inte alla får dem. De vanligaste biverkningarna är infektioner i de övre luftvägarna med symtom som halsont eller täppt nästa, samt vita eller gula fläckar i munnen orsakade av svamp i munhålan. Läs broschyren med patientinformation för ytterligare information om möjliga biverkningar av detta läkemedel. Om du upplever tecken på allvarlig infektion, såsom feber, andfåddhet eller hudutslag med blåsor ska du omgående informera din läkare eller söka medicinsk hjälp. Håll utkik efter tecken på allergisk reaktion, såsom andningssvårigheter eller svårigheter att svälja, yrsel eller svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen, eller svår klåda på huden, med röda utslag eller upphöjda knölar, då även detta kräver omedelbar läkarvård. Sluta använda detta läkemedel och tala med din läkare om du får symtom på inflammatorisk tarmsjukdom, såsom blod i avföringen, kramp eller smärta i buken, diarré eller vikttnedgång.



Hur gör jag om jag måste resa med BIMZELX?

Förvara de förfyllda injektionspennorna/sprutorna i originalkartongen. Ljuskänsligt. Förvaras i kylskåp (2-8 °C). Bimzelx kan förvaras utanför kylskåp i upp till 25 dagar (vid högst 25 °C).



Kan jag ta BIMZELX när jag är gravid eller om jag planerar att bli gravid?

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, be din läkare om råd innan du använder detta läkemedel. Som en säkerhetsåtgärd bör man undvika användning av BIMZELX vid graviditet. Detta beror på att man inte vet hur läkemedlet påverkar barnet. Om du är en kvinna som kan bli gravid ska du använda preventivmedel när du använder detta läkemedel och i minst 17 veckor efter din sista dos av detta läkemedel.

Kan jag amma när jag tar BIMZELX?

Om du ammar eller planerar att amma, tala med din läkare innan du använder detta läkemedel. Du bör i samråd med din läkare bestämma om du kan amma eller använda BIMZELX.

REUMATOLOGI

Välkommen till din behandling med BIMZELX

Din läkare har ordinerat BIMZELX och det är nu dags för nästa steg i behandlingen. Här kommer en kort förklaring om vad som händer nu. Se även broschyren med patientinformation som levereras tillsammans med din medicin.

BIMZELX är ett biologiskt läkemedel som tillhör en läkemedelsgrupp som heter interleukin (IL)-hämmare. BIMZELX verkar genom att minska aktiviteten hos två proteiner som kallas IL-17A och IL-17F, som är inblandade i att orsaka inflammation. Genom att inrikta sig på dessa proteiner hjälper BIMZELX till att minska inflammationen och minska symtomen.

Denna information riktar sig till dig som har fått Bimzelx utskrivet av läkare.

Bimzelx innehåller den aktiva substansen bimekizumab.

Indikationer: Bimzelx används hos vuxna för att behandla följande inflammatoriska sjukdomar: plackpsoriasis, psoriasisartrit, axial spondylartrit, inklusive icke-radiografisk axial spondylartrit och ankyloserande spondylit (AS, radiografisk axial spondylartrit) samt hidradenitis suppurativa

Använd inte Bimzelx: Om du är allergisk mot bimekizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel eller om du har en infektion som läkaren bedömer är av betydelse. Detta läkemedel ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte har studerats i denna åldersgrupp.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR



Vad behöver jag meddela min läkare INNAN jag påbörjar behandlingen?

Tala om för din läkare om du nyligen har fått eller planerar att få ett vaccin. Du bör inte få vissa typer av vacciner (levande vacciner) när du använder BIMZELX. Se till att din vårdgivare är informerad om du har en pågående infektion eller en återkommande infektion, om du någonsin har haft tuberkulos (TB) eller om du någonsin har haft inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit).



Hur lång tid tar det för BIMZELX att verka?

Läkemedel fungerar olika för alla. Om BIMZELX fungerar för dig kan du förvänta dig att märka av fördelarna, såsom en minskning av symtom. Din läkare kommer tillsammans med dig i samband med ett återbesök, att utvärdera effekten.



Kan jag ta BIMZELX med andra läkemedel?

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

I denna patientinformation beskrivs dosering och administrering i samband med:

1. Ankyloserande spondylit (AS)
2. Icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA)
3. Psoriasisartrit

BIMZELX administreras genom en förfylld penna eller en förfylld spruta.

Vid behandling av AS, nr-axSpA och psoriasisartrit är den rekommenderade dosen:

- **160 mg (som ges som en subkutan injektion) var fjärde vecka. Du kan välja att ta injektionen med en spruta eller en penna.**

*För personer som har diagnostiserats med både psoriasisartrit och måttlig till svår plackpsoriasis är den rekommenderade dosen:

- 320 mg ges som en subkutan (320 mg) eller två subkutana (160 mg) injektioner vid vecka 0, 4, 8, 12, 16 och var åttonde vecka därefter.



Förfylld spruta

eller

Injektionsklar penna

160 mg
VECKA 12
Fjärde dosen

4 veckor

160 mg
VECKA 16*
Femte dosen

4 veckor

160 mg
VECKA 20
Sjätte dosen

4 veckor

160 mg
VECKA 24
Sjunde dosen

4 veckor

160 mg
VECKA 28
Åttonde dosen

4 veckor

NÄR DU STÅR PÅ BEHANDLINGEN KOMMER DU ATT INJICERA EN DOS LÄKEMEDEL VAR FJÄRDE VECKA. DET FINNS FÖRFYLLEDA SPRUTOR OCH INJEKTIONSKLARA PENNOR ATT VÄLJA MELLAN.

160 mg
VECKA 0

Första dosen

160 mg
VECKA 4

Andra dosen

160 mg
VECKA 8

Tredje dosen

4 veckor

Bimzelx®
(bimekizumab)

Läs alltid bipacksedeln vilken följer med läkemedlet samt informationen som står på den yttre förpackningen. I bipacksedeln hittar du fullständig information om användning, varningsföreskrifter, biverkningar och dosering. Bipacksedeln finns även tillgänglig på www.fass.se.

- ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta möjliggör snabb identifiering av ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får genom att tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

UCBCares

När en ny behandling startas kan det komma upp frågor. När det gäller läkemedel som tillhandahålls från UCB Pharma, så som BIMZELX, är du välkommen att höra av dig till oss via UCBCares.



Så kontaktar du oss:

TELEFON: **0200 898 671**

E-POST: **UCBCares.se@ucb.com**

WEBB: **www.ucbcares.se**

